

Вакцинопрофилактика

Благодаря массовой вакцинации удалось полностью уничтожить некоторые болезни. Вакцинопрофилактика - осуществляемые мероприятия в целях предупреждения, ограничения, распространения и ликвидации инфекционных болезней путём проведения профилактических прививок.

Проведение профилактических прививок является одним из важнейших мероприятий, предпринимаемых для сохранения и укрепления здоровья детей.

Защиту организма от возбудителей инфекционных заболеваний осуществляет иммунная система. Она способна защитить ребенка от постоянно окружающих нас микроорганизмов (кишечной палочки, стрептококков и других), но не всегда в силах справиться с возбудителями дифтерии, вирусного гепатита «А», «В», коклюша, столбняка, кори и других инфекционных заболеваний. Прививки, полученные в детстве, в большинстве случаев, создают основу иммунитета против отдельных инфекций на всю жизнь.

Рекомендации перед и после вакцинации

Перед прививкой ребенка нужно оберегать от контактов с больными. При наличии пищевой аллергии необходимо строго соблюдать диету, не вводить в рацион новые продукты. Такой же тактики нужно придерживаться в течение 5-7 дней после прививки. После прививки у некоторых детей может наблюдаться постпрививочная реакция, такая как: повышение температуры, покраснение или уплотнение в месте введения вакцины.

Это закономерная реакция, которая говорит о начале формирования защиты от инфекции. Как правило, такая реакция носит кратковременный характер (1-3 дня).

При повышении температуры до 38⁰ не требуется никакого лечения, температура выше 38⁰, необходимо использовать жаропонижающие средства, назначение сделает врач-педиатр, в соответствии с возрастом ребенка.

Каждый человек имеет право сделать свой выбор – прививаться или нет, но родители должны знать, что отказываясь от прививок, они лишают не только защиты своего ребенка, но и подвергают опасности других детей, а также способствуют распространению инфекционных заболеваний в обществе.

Вакцинация защищает здоровье человека на каждом этапе его жизни.

Прививая своих детей, не стоит забывать про себя. Каждый взрослый должен раз в 10 лет делать прививку от дифтерии и столбняка, ежегодно - от гриппа.

Противогриппозная вакцинация особенно показана пожилым людям, снижает заболеваемость и смертность от инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца, предупреждает обострение различных хронических заболеваний и т.д.

Помните, своевременно привитый человек защищен от многих опасных инфекционных заболеваний.